



תכשירי הדברה מותרים בתמרים למת"י עונה 2024-25
Proposed Plant Protection List for Dates 2024-25
 השימוש בתכשיר באחריות המגדל ולאחר קריאת התווית וההנחיות

הדברת מזיקים						
מזיק	תכשיר	שם גנרי	ריכוז / כמות לדונם	ימי המתנה	הערות	יעדים בעיתיים
עש התמר הקטן <i>Batrachedra anydraula</i>	אלסיסטין	Triflumuron	0.05%	100	א. מטפלים פעמיים בלבד, בזמן ההפרייה בלבד - עד סוף חודש מרץ ב. 50 ג' תכשיר לק"ג אבקה בפריחה	חומר שארתי מאוד!! בעיתי באירופה/ לא לסיף/ לארה"ב
	ביו-טי פלוס (אורגני)	Bacillus Thuringiensis	2.0%	3	לעץ 5 ליטר	
	ביטיון - פתיון		לעץ 50-100 גרם	<<<	א. בתקופת ההפריה - יש לערבב 200 גרם ביטיון לק"ג אחד של אבקת פרחים להפריה. ב. לאחר תקופת ההפריה - יש לאבק ללא תוספת אבקת פרחים. ג. המינון בהתאם למס' האשכולות. ד. יש לחזור על האיבוק מדי שבועיים, כל עוד יש פעילות מזיק. ריסוס מכוון לתפרחת בשעות הקרירות של היום (אחה"צ/ערב)	
	תורסייד (אורגני)		500	<<<		
	קורגן	Chlorantraniliprole	0.02%	155	עד נגירה	חומר שארתי - בעיתי באירופה
	מוליט	Teflubenzuron	0.08%	60		לא לאירופה
טרייסר אולטרה (אורגני)	טרייסר אולטרה	Spinosad	0.04-0.06%	80	עד 3 יישומים בעונה - אין להשתמש לאחר חודש מאי * עשוי להפחית נגיעות חיפושית התסיסה	לא לקנדה
טרייסר אולטרה						

הדברת מזיקים - המשך							
מזיק	תכשיר	שם גנרי	ריכוז / כמות לדונם	ימי המתנה	הערות	יעדים בעיתיים	
עש החרוב + עש הצימוקים <i>Ectomyelois ceratoniae + Cadra figulilelia</i>	קרטה 5	Lambda Cyhalothrin	0.1%	90	ריסוס לאשכולות בלבד *יעיל כנגד כנימה פרדוניה בגודל עד 0.5 ס"מ אין לשלב עם תכשירים נוספים	בעייתי בחלק מהרשתות באירופה/ לא ארה"ב/ סין	
ציקדת הדבש <i>Ommatissus binotatus</i>	קונפידור	Imidacloprid	5 סמ"ק/עץ	30	רק אחרי שהציקדה מתגלה. הגמעה בקרקע בשליש השני של ההשקייה. הציקדה בעלת 2 דורות: אביב וסתיו. פעילות התכשיר 10-14 יום אחרי יישום. *ידביר גם דרני חדקונית הדקל.	לא ליצוא! רק שוק מקומי	
	סייפן						
	קוהינור 350						
חדקונית הדקל האדומה <i>Rhynchophoru S ferrugineus</i>	טוטם	Gamma Cyhalothrin + Imidacloprid	0.2%	30	ריסוס סביב החוטרים עד נגירה אין לרסס בעץ נושא פרי	לא ליצוא! רק שוק מקומי	
	ביווריה (אורגני)	Beauveria bassiana Strain GHA		10	טיפול מניעתי בלבד - אינו יעיל אם העץ כבר נגוע - יש לחזור מידי 3 חודשים ריסוס הגזע עד לגובה 2 מ' והקרקע מסביב בקוטר 1 מ'		
	נמה-סטאר (אורגני - ביולוגי)	Steinernema carpocapsae		לא רלוונטי	לא	קילוח הכתר, הגזע ובסיס העץ. ליישם 2 יישומים עוקבים בהפרש של כחודש	
	קונפידור	Imidacloprid		10 סמ"ק/עץ	30	הגמעה פעם בחודש, במשך 3 חודשים עוקבים, החל מחודש מרץ	לא ליצוא! רק שוק מקומי
אקרית הקורים של התמר <i>Oligonychus sp</i>	גפרביק 70 אבקה (אורגני)	Sulfur	100-150 ג"עץ	3	אין לאבק בטמפ' מעל 28 מעלות מכיוון שעלול לגרום לצריבות		
	ביומקטין אגרירון ורקוטל ורטימק	Abamectin	0.1%	7	בתוספת שמן אולטרפיין 0.5-0.1%		

שימושים שונים						
הפגע	תכשיר	שם גנרי	ריכוז / כמות לדונם	ימי המתנה	הערות	יעדים בעיתיים
משחות עצים Wound sealing	תפזהיל	Asphalt (Bitumen)	<<<	לא רלוונטי	מורחים במברשת פצעי גיזום/ שבר, תוך הקפדה על כיסוי מלא, ולהימנע ממריחת פצעים יבשים	
מוסתי צמיחה Growth regulators	אלפאנול סופר	NAA - 1-Naphthalene Acetic Acid	25 ח"מ	<<<	זן חייאני ברהי - שיפור איכות הפרי ודחיית הבשלה. ריסוס ראשון - בהחלפת צבע ריסוס שני - 7-10 ימים אחרי עד נגירה - כחצי ליטר לאשכול *רק פירות שיחשפו לתכשיר יושפעו.	
	יוניק	Uniconazole	70-75 מ"ל לעץ	לפחות 100	יישום כשבועיים לאחר סיום ההאבקה. מינון נמוך - עצים צעירים לקראת ניבה ראשונה ועד ניבה שלישית. הטיפול יינתן אחת לשנתיים	עבור זן מג'והל בלבד
	גימיק		לפי גיל העצים	<<<	זן מג'והל ובהרי יישום באמצעות הגמעה עצים צעירים לקראת ניבה ראשונה עד ניבה שלישית - 50 סמ"ק לעץ. עצים בוגרים לקראת ניבה רביעית ואילך - 75 סמ"ק לעץ.	לא לסין/ קנדה/ ארה"ב

הדברת מחלות						
הפגע	תכשיר	שם גנרי	ריכוז / כמות לדונם	ימי המתנה	הערות	יעדים בעיתיים
רקבון תפרחות <i>Mauginiella scaetiae</i>	צ'מפיון	Copper Hydroxide	0.5%	7	עד נגירה	
כוויה שחורה <i>Thielaviopsis paradoxa</i>	פנגרון 50 (אורגני)	Copper Hydroxide	0.3%	7	לעץ - 0.6 ליטר בהגמעה ללולב אין לשלב עם תכשירי הדברה	החל מסוף אפריל כשיש פרי על העץ - אסור לטפל!
	צ'מפיון		0.5%	7	הורדת כפות נגיעות!	
	קוצייד 2000 (אורגני)		7	עד נגירה		
עובש שחור <i>Metschnikowia fruticola</i>	נולי (אורגני)	Metschnikowia fruticola	0.3%	7	בפריחה 2-4 טיפולים	
דיפלודיה <i>Diplodia sp</i>	תפזהיל משחה	Asphalt Base	מריחה	<<<	למריחה על פצעי חיתוך וגיזום בחוטרים, סמוך לנטיעה	
	צ'מפיון	Copper Hydroxide	0.5%	7		

תכשירים לשימוש אחר קטיף						
הפגע	תכשיר	שם גנרי	ריכוז / כמות לדונם	ימי המתנה	הערות	יעדים בעיתיים
לאחר קטיף Post harvest Treatment	דונגל 901 תמרים	Carnauba Wax	לטון 1-2 ליטר		לבהרי בלבד! לטיפול במתקן דינוג	

קוטלי עשבים - המשך: יש להמנע מכל התזה של התרסיס על הפרי!
שארית תוביל לפסילת המכירה בארץ ובחו"ל!
 שילובים/מינונים חובה לבדוק בתווית

שם התכשיר	שם גנרי	כמות לדונם \ ריכוז	שלב גידול	שלב עשב	הערות	יעדים בעיתיים
אורורה	Carfentrazone Ethyl	5 גרם - ריסוס במוט	משנה שלישית	עד 50 ס"מ	בשילוב עם תכשיר גלייפוסט להדברת עשבייה קיצית.	
אקופרט	Pyraflufen Ethyl	45 גרם			בשילוב גלייפוסט	
בסטה 20 פאסטר בומבה	Glufosinate Ammonium	1-2%	מנטיעה	עשבייה קיימת	בתווית הנחיה למינון	
גליגן	Oxyfluorfen	400 סמ"ק	מגיל שנתיים	עד 10 ס"מ	מומלץ לרסס 50 סמ"ק בשילוב ראונדאפ 1%	
גליידר	Diuron + Oxifluorfen + Glyphosate	400 סמ"ק	מגיל שנתיים	עד 30 ס"מ	אין להשתמש כשמערכת ההשקיה פועלת או על שלוליות.	
גלייפון גאלופ גלייפוגן גלייפוס טורנדו ראונדאפ טייפון ראונדאפ מקס איזיקטול	Glyphosate	1%	מגיל שנה	עשבייה קיימת	בהתאם לגובה וסוג העשבייה (5 ס"מ ומעלה) ניתן להעלות עד ריכוז 2%	
זומר אוקסיפסט	Oxifluorfen + Glyphosate	200-300 סמ"ק	מגיל שנה	עד 40 ס"מ	מומלץ לרסס 25 סמ"ק בשילוב ראונדאפ 1%	
דיאורקס סאנדורון	Diuron	200-300 גר' / 200 סמ"ק	מגיל 3 שנים	מונע הצצה	הקפדה יתרה על הנחיות התוית! לקרקע בינונית וכבדה	
אליון	Indaziflam	15 גרם	מגיל 3 שנים	קדם הצצה	רק לאחר גשם ראשון משמעותי, על קרקע לחה. לא לשימוש בקרקע חולית/סדוקה/ או עם אחוז חומר אורגני גבוה	
טומוהוק טנדוס	Fluroxypyr	0.25-0.5% / 0.50%	מגיל 3 שנים	עשב קיים		
פאלקון	Diflufenican	50 סמ"ק	מגיל שנה			